

Цироз печінки: сучасний погляд на проблему

Т. М. Бенца

Вступ. Цироз печінки (ЦП) належить до важливих медичних і соціально-економічних проблем не лише в Україні, а й у всьому світі. Актуальність хвороби зумовлена значною її поширеністю, збільшенням чисельності етіологічних чинників, а також виникненням тяжких ускладнень, що призводять до летального наслідку.

Мета. Зробити огляд наукової літератури й узагальнити опубліковані дослідження, присвячені проблемі вивчення етіології, класифікації, клінічних ознак та діагностики цирозу печінки.

Матеріали й методи. Використано контент-аналіз, метод системного та порівняльного аналізу, бібліосемантичний метод вивчення актуальних наукових досліджень стосовно етіології, класифікації, клінічних ознак та діагностики ЦП.

Результати. ЦП посідає 11-те місце серед найбільш поширених причин смерті. Найчастішими причинами виникнення ЦП є хронічна інтоксикація алкоголем та вірусні гепатити В, С і D. ЦП властиве наростання тяжкості, що характеризується ураженням паренхіми печінки з некрозом, дистрофією гепатоцитів, їх вузловою регенерацією, а також її інтерстицію з дифузним розростанням сполучної тканини, що призводить до виникнення недостатності печінки та портальної гіпертензії. Попри існування низки класифікацій ЦП – за морфологією, етіологією, тяжкістю, перебігом, вираженістю печінково-клітинної недостатності, ступінь тяжкості хвороби зазвичай визначають оцінюючи функціональний резерв печінки (за класифікацією Ч. Г. Чайлд – Р. Н. П'ю). У хворих на ЦП часто виникають такі загрозливі для життя стани, як кровотеча з варикозно розширених вен, асцит, спонтанний бактерійний перитоніт, печінкова енцефалопатія, гепаторенальний синдром.