

# ПРОТИАЛЕРГІЧНА ЛІНІЙКА від Фармак

# Едем<sup>®</sup> та Едермік



## КОРОТКА ІНСТРУКЦІЯ ПО ЗАСТОСУВАННЮ ЕДЕМ, ЕДЕРМІК

**ЕДЕМ ТАБЛЕТКИ.** **Склад:** 1 таблетка містить дезлоратадину у перерахуванні на безводну 100% речовину 5 мг. Код АТХ R06A X27. **Показання.** Усунення симптомів, пов'язаних з: алергічним ринітом, кропив'янкою. **Спосіб застосування.** Дорослим і дітям від 12 років препарат призначають 5 мг (1 таблетка) 1 раз на добу, незалежно від прийому їжі.

**ЕДЕМ СИРОП.** **Склад:** 1 мл сиропу містить дезлоратадину у перерахуванні на 100% речовину 0,5 мг. Код АТХ R06A X27. **Показання.** Усунення симптомів пов'язаних з: алергічним ринітом (чихання, виділення з носу, свербіж, набряк та закладеність носа, свербіж та почервоніння очей, слезотеча, свербіж у ділянці піднебіння та кашель) та кропив'янкою (свербіж, висипання). **Спосіб застосування.** Діти віком від 6 до 11 місяців: по 2 мл сиропу 1 раз на добу, віком від 1 до 5 років: по 2,5 мл сиропу 1 раз на добу, віком від 6 до 11 років: по 5 мл сиропу 1 раз на добу.

**ЕДЕРМІК КРАПЛІ.** **Склад:** діюча речовина: диметиндена малеат; 1 мл крапель оральних (20 крапель) містить диметиндену малеату (у перерахуванні на 100% суху речовину) – 1мг. Код АТХ R06A B03. **Показання.** Симптоматичне лікування алергічних захворювань: кропив'янки, сезонного (сінна гарячка) та цілорічного алергічного риніта, алергії на лікарські засоби і продукти харчування. Свербіж різного походження, крім пов'язаного з холестазом. Свербіж при захворюваннях із шкірними висипаннями, такими як вітряна віспа. Укуси комах. Допоміжний засіб при екземі та інших свербіжних дерматозах алергічного генезу. **Спосіб застосування.** Дорослим, дітям віком від 12 років та пацієнтам літнього віку. Рекомендована добова доза становить 3–6 мг, розподілена на 3 прийоми – 20–40 крапель 3 рази на добу. Дітям віком від 1 місяця до 1 року можна застосовувати тільки після консультації з лікарем. Рекомендована добова доза становить 0,1 мг (тобто 2 краплі) на кг маси тіла на добу, розподілена на 3 прийоми. 20 крапель=1мл=1 мг диметиндену малеату.

**ЕДЕРМІК ГЕЛЬ.** **Склад:** діюча речовина: диметиндена малеат; 1 г гелю містить диметиндену малеату 1мг. Код АТХ D04A A13. **Показання.** Шкірний свербіж, наприклад при укусах комах, необширна сонячна еритема, неускладнені невеликі опіки шкіри та алергічні подразнення невеликих ділянок шкіри. **Спосіб застосування.** Дітям віком до 2 років препарат можна застосовувати лише за призначенням лікаря. Немовлятам і дітям молодшого віку не слід застосовувати препарат на великих ділянках шкіри, особливо на пошкодженій або запальній шкірі. Дорослим і дітям від 2 років гель слід наносити на уражені ділянки 2–4 рази на добу.

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВИРОБНИК  
ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ  
ЄВРОПЕЙСЬКОГО РІВНЯ

Реклама лікарських засобів. Інформаційний матеріал для розміщення в спеціалізованих виданнях, призначений для лікарів та медичних установ та лікарів, а також для розповсюдження на конференціях, семінарах, симпозиумах з медичної тематики.

Р.П. № UA/В360/01/01, від «19» 03 2018 р. (наказ МОЗ України від «19» 03 2018 р. № 506), Р.П. № UA/7746/01/01, від «12» 09 2018 р. (наказ МОЗ України від «12» 09 2018 р. № 1664) Р.П. № UA/16984/01/01 від 22.10.2018 (наказ МОЗ України від «22» 10 2018 р. № 1920); Р.П. № UA/17481/01/01 від 13.06.2019 (наказ МОЗ України від «13» 06 2019 р. № 1396). УКР/ПРОМО/12/2020/ЕДЕ\_ЕДК/ДМ/001

Виробник АТ «Фармак», вул. Кирилівська, 63, м. Київ, 04080, Україна; Додаткова інформація за тел.: +38(044)496-87-87, e-mail: info@farmak.ua.



